

MORCHELLA -SYNDROM

K. Schenk – Jäger, H. Kupferschmidt

NOTFALL / URGENCIE 145
TEL +41 44 251 66 66
FAX +41 44 252 88 33
E-MAIL info@toxinfo.ch
INTERNET www.toxinfo.ch



Morchella esculenta (Speisemorchel)

Bild: G. Martinelli

Ursachen *Morchella conica* (Spitzmorchel)

Morchella esculenta (Speisemorchel)

Ptychoverpa bohemica (Böhmisches Verpel)

Toxin unbekannt

Klinik 6-12 h nach reichlichem Genuss frischer Morcheln Ataxie, Schwindel, Miosis/Mydriasis, Diarrhoe.

Therapie symptomatisch

Prognose spontane Erholung innert 1 Tag.

Literatur Pfab R, Haberl B, Kleber J, Zilker T. Cerebellar effects after consumption of edible morels (*Morchella conica*, *Morchella esculenta*). Clin Toxicol 2008; 46: 259-60.

Piqueras J. La toxicidad de las colmenillas (*Morchella* sp.). Lactarius 2003; 11: 83-7.

Nothnagel P. Gesundheitliche Störungen nach Morchelgenuss. Mykologisches Mitteilungsblatt, Halle/S6, 1962; 32-33.

Flammer R. Das Morchella-Syndrom. Schweiz. Zeitschr Pilzkunde 2007; 85: 215-6