


N-acetilcisteina (NAC) - protocollo a 2 sacche

Terapia del sovradosaggio di paracetamolo

Nuovo (dal 1.2.2024): protocollo a 2 sacche invece di protocollo a 3 sacche

Il protocollo a 2 sacche in breve:

- Stessa dose complessiva
- Stessa efficacia
- Meno effetti collaterali indesiderati



1^a sacca con 200 mg NAC / kg PC su 4 ore

La prima fase di 1 ora con 150mg NAC /kg PC e la seconda fase di 4 ore con 50mg /kg PC vengono riunite in una singola fase e una sola sacca.

2^a sacca con 100mg NAC /kg PC su 16 ore

Corrisponde a quella che prima era la terza fase.

Riferimenti bibliografici:

- Chiew AL, et al. Updated guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand. *Med J Aust.* 2020;212(4):175–183.
- Wong A, et al. Efficacy of a two bag acetylcysteine regimen to treat paracetamol overdose (2NAC study). *EClinicalMedicine.* 2020;20 (100288).
- Cole, J. B, et al. Is Two Better Than Three? A Systematic Review of Two-bag Intravenous N-acetylcysteine Regimens for Acetaminophen Poisoning. *West J Emerg Med.* 2023; 24(6): 1131-45.