


# N-Acetylcystein (NAC) - 2-bag Schema Therapie der Paracetamol Überdosierung

**Neu ab 1.2.2024: 2-bag Schema anstelle 3-bag Schema**

## 2-bag Schema in Kürze:

- Gleiche Gesamtdosis
- Gleiche Effektivität
- Weniger unerwünschte Nebenwirkungen



### 1. Bag: 200 mg NAC / kg KG über 4 Stunden

Die erste Phase mit 150mg NAC /kg KG über 1h und die zweite Phase mit 50mg /kg KG über 4h werden zusammengenommen.

### 2. Bag: 100mg NAC /kg KG über 16 Stunden

Dies entspricht der früheren dritten Phase.

## Referenzen:

- Chiew AL, et al. Updated guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand. *Med J Aust.* 2020;212(4):175–183.
- Wong A, et al. Efficacy of a two bag acetylcysteine regimen to treat paracetamol overdose (2NAC study). *EClinicalMedicine.* 2020;20 (100288).
- Cole, J. B, et al. Is Two Better Than Three? A Systematic Review of Two-bag Intravenous N-acetylcysteine Regimens for Acetaminophen Poisoning. *West J Emerg Med.* 2023; 24(6): 1131-45.